

اگر به هر دلیل امکان ارائه‌ی کامل سوابق خود را ندارید و در یک سال گذشته رفتارهای پرخطری مانند خالکوبی، تماس جنسی خارج از چارچوب خانواده، بازداشت یا زندان، تزریق خون، حجامت یا مصرف برخی داروها داشته‌اید و یا علائمی از بیماری‌های عفونی یا خونی مانند ایدز، هپاتیت یا بیماری‌های مقاربتی در شما وجود دارد، پلاسمای شما نباید در تولید دارو استفاده شود.

این انتخاب کاملاً محرمانه و بدون درج نام ثبت می‌گردد.

مراحل خودحذفی:

- ۱- وارد کردن کد ملی
- ۲- وارد کردن شماره موبایل (بدون صفر)
- ۳- انجام احراز هویت
- ۴- انتخاب یکی از گزینه‌ها:

☐ پلاسمای من استفاده شود

☐ پلاسمای من استفاده نشود

یادآور می‌شود پاسخ شما در روند انجام آزمایش‌های اجباری تان تغییری ایجاد نخواهد کرد.



خود حذفی

اهدانکننده گرامی، لطفاً برای تکمیل مرحله خودحذفی محرمانه، اطلاعات مندرج در این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

هدف از خودحذفی محرمانه این است که اگر به هر دلیل احساس می‌کنید پلاسمای شما نباید برای ساخت فرآورده‌های درمانی استفاده شود، بتوانید این موضوع را به صورت کاملاً محرمانه اعلام کنید. این کار به انتخاب سالم‌ترین پلاسمای کمک می‌کند، از سلامت خود شما محافظت می‌نماید و ایمنی بیماران را تضمین می‌کند. **انتخاب محرمانه شما** نشانه‌ی مسئولیت‌پذیری است و به حفظ سلامت فرآورده‌های پلاسمایی کمک می‌کند.

اطلاعات تماس

مرکز اهدا پلاسمای ویستادرمان ملل

مشهد - ایران

حجاب ۹۵، بلوار حجاب

کد پستی ۹۱۸۷۱۸۸۱۳۰

۰۵۱-۳۶۲۰۷۴۰۵

info@Vdm-plasma.com

Vdm-plasma.com

ایدز (AIDS)

عامل بیماری ایدز ویروس HIV است که راههای انتقال آن عبارتند از:

(۱) تماس جنسی با فرد آلوده و بی بند و باری جنسی

(۲) سرنگ آلوده.

(۳) تزریق خون.

(۴) مادر به جنین.

ابتلای HIV ابتدا با علائم شبیه آنفلوآنزا شروع می‌شود و ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها بدون علامت بماند. در ادامه، تورم غدد لنفاوی، لکه‌های پوستی و کاهش وزن ظاهر شده و حدود نیمی از مبتلایان طی ده سال به ایدز شدید با علامت دچار می‌شوند.



گروه‌های خطر

گروه‌های خطر شامل افراد در معرض آلودگی به عفونتهای ویروسی می‌باشند مانند: افراد مبتلا به بیماریهای ایدز، هپاتیت و بیماریهای مقاربتی (سیفلیس و سوزاک) و شرکای جنسی آنان، معتادان تزریقی، زندانیان.



هپاتیت (HEPATITIS)

راههای انتقال ویروس هپاتیت عبارتند از:

(۱) تماس جنسی مشکوک

(۲) خون آلوده

(۳) سرنگ مشترک

(۴) مادر به جنین.

این بیماری همچنین از طریق سرنگ آلوده، خالکوبی، پیرسینگ (حلقه انداختن در گوش و بدن) منتقل می‌شود. بعد از آلودگی ویروس هپاتیت، ضعف و بی‌اشتهایی و زردی پیش‌رونده بروز می‌کند و سپس اشکال مزمن بیماری اتفاق می‌افتد یعنی ویروس غیر فعال است و با فعالیت مجدد، علائم هپاتیت بروز می‌کند.

VIRAL HEPATITIS

